



検尿異常早見表

暫定診断名、管理区分、紹介基準


血尿単独



蛋白尿単独



血尿・蛋白尿合併



専門施設紹介基準


- | | |
|--|---|
| 1、(2+) または尿蛋白/尿Cr比0.5以上の蛋白尿
2、スポット尿(一回尿)で蛋白/Crが0.15 以上が
3ヶ月以上継続する場合
3、血尿・蛋白尿が合併している場合
4、肉眼的血尿
5、低蛋白血症(血清Alb 3.0mg/dL未満) | 6、低補体血症(C ₃ <70mg/dL, C ₄ <10mg/dL)
7、高血圧、浮腫、腎機能障害の存在
8、良性家族性血尿を除く、
腎疾患の家族歴がある場合 |
|--|---|

上記の1項目でも該当する場合は小児腎臓専門施設受診を勧める。

※ 管理区分がE以外で制限が必要と考えた場合には、その制限が妥当かどうかを判断するためにも一度専門施設へ紹介する



体位性蛋白尿の診断方法の一つ（正確な安静時尿の採取法）



血清クレアチニン正常値 酵素法による基準値

3か月以上12歳未満（男女共通）

年齢	2.5パーセンタイル	50パーセンタイル	97.5パーセンタイル
3-5か月	0.14	0.20	0.26
6-8か月	0.14	0.22	0.31
9-11か月	0.14	0.22	0.34
1歳	0.16	0.23	0.32
2歳	0.17	0.24	0.37
3歳	0.21	0.27	0.37
4歳	0.20	0.30	0.40
5歳	0.25	0.34	0.45
6歳	0.25	0.34	0.48
7歳	0.28	0.37	0.49
8歳	0.29	0.40	0.53
9歳	0.34	0.41	0.51
10歳	0.30	0.41	0.57
11歳	0.35	0.45	0.58

12歳以上17歳未満（男女別）

年齢	2.5パーセンタイル		50パーセンタイル		97.5パーセンタイル	
	男児	女児	男児	女児	男児	女児
12歳	0.40	0.40	0.53	0.52	0.61	0.66
13歳	0.42	0.41	0.59	0.53	0.80	0.69
14歳	0.54	0.46	0.65	0.58	0.96	0.71
15歳	0.48	0.47	0.68	0.56	0.93	0.72
16歳	0.62	0.51	0.73	0.59	0.96	0.74

推算GFRを知りたい場合はスマートホンの無料のアプリケーション“child eGFR”をご利用ください。