


検尿異常早見表 暫定診断名、管理区分、紹介基準




専門施設紹介基準

下記の1項目でも該当する場合は小児腎臓専門施設を勧める

- 1、スポット尿(一回尿)で尿蛋白/尿Cr比0.5以上(2+以上)の蛋白尿
- 2、スポット尿(一回尿)で蛋白/Crが0.15以上が3ヶ月以上継続する場合
- 3、血尿・蛋白尿が合併している場合
- 4、赤血球円柱、顆粒円柱、肉眼的血尿(赤血球尿50/HPF以上が2回連続)
- 5、低蛋白血症(血清Alb 3.0g/dL未満)
- 6、低補体血症(C3<70mg/dL、C4<10mg/dL)
- 7、高血圧、浮腫、腎機能障害の存在
(高血圧の目安 6歳 110mmHg以上、10歳 120mmHg以上、15歳 130mmHg以上)
- 8、良性家族性血尿を除く、腎疾患の家族歴がある場合
- 9、白血球50/HPF以上が2回以上連続持続
- 10、尿β2ミクログロブリン/尿Cr比が基準値を超える(計算式:尿中β2MG/尿Cr÷10)
(小学生>0.35μg/mgCr、中学生以上 >0.3μg/mgCr)



体位性蛋白尿の診断方法の一つ(正確な安静時尿の採取法)



血清クレアチニン正常値 酵素法による基準値

3か月以上12歳未満 (男女共通)

| 年齢 | 2.5パーセンタイル | 50パーセンタイル | 97.5パーセンタイル |
|--------|------------|-----------|-------------|
| 3-5か月 | 0.14 | 0.20 | 0.26 |
| 6-8か月 | 0.14 | 0.22 | 0.31 |
| 9-11か月 | 0.14 | 0.22 | 0.34 |
| 1歳 | 0.16 | 0.23 | 0.32 |
| 2歳 | 0.17 | 0.24 | 0.37 |
| 3歳 | 0.21 | 0.27 | 0.37 |
| 4歳 | 0.20 | 0.30 | 0.40 |
| 5歳 | 0.25 | 0.34 | 0.45 |
| 6歳 | 0.25 | 0.34 | 0.48 |
| 7歳 | 0.28 | 0.37 | 0.49 |
| 8歳 | 0.29 | 0.40 | 0.53 |
| 9歳 | 0.34 | 0.41 | 0.51 |
| 10歳 | 0.30 | 0.41 | 0.57 |
| 11歳 | 0.35 | 0.45 | 0.58 |

12歳以上17歳未満 (男女別)

| 年齢 | 2.5パーセンタイル | | 50パーセンタイル | | 97.5パーセンタイル | |
|-----|------------|------|-----------|------|-------------|------|
| | 男児 | 女児 | 男児 | 女児 | 男児 | 女児 |
| 12歳 | 0.40 | 0.40 | 0.53 | 0.52 | 0.61 | 0.66 |
| 13歳 | 0.42 | 0.41 | 0.59 | 0.53 | 0.80 | 0.69 |
| 14歳 | 0.54 | 0.46 | 0.65 | 0.58 | 0.96 | 0.71 |
| 15歳 | 0.48 | 0.47 | 0.68 | 0.56 | 0.93 | 0.72 |
| 16歳 | 0.62 | 0.51 | 0.73 | 0.59 | 0.96 | 0.74 |

※ 推算GFR(eGFR)を知りたい場合はスマートフォンの無料アプリケーション“child eGFR”をご利用ください。